Warnung: extrem hochdosierte LSD-Filze

Name	Schmetterling
Größe	6.5 x 7.5 mm
Farbe	Braun
Inhaltsstoffe	397.1 µg LSD 139.3 µg 1cP-LSD
Getestet in	Zürich (CH), 26. März 2021





Risikoeinschätzung

Über 150 µg LSD können zu viel sein. Hohe Dosen erhöhen das Risiko selbst für erfahrene Konsumenten. Es können höchst intensive psychedelische Erlebnisse hervorgerufen werden, welche verstörend und angsteinflößend sein können. Auch paranoide Vorstellungen können vorkommen. Das Wahrnehmen kann eine eigenartige Übersensibilität aufweisen. Musik, Licht und andere Reize können dabei als extrem unangenehm empfunden werden. Auch eine Körper-Geist Trennung kann auftreten.

Im Jahr 2018 enthielten die von uns analysierten LSD Filze **durchschnittlich 99.8 µg LSD**. Dies ist die Dosierung, welche ungefähr die Wirkungsstärke, welche die meisten LSD Konsumenten erwarten. Die meisten Konsumierenden gehen aufgrund der Fehlinformationen beim Verkauf (LSD-Filze werden meistens als 200 µg verkauft) von viel zu hohen Dosierungen aus.

Infos zur LSD

Dosierung: Ab bis 75µg werden als leicht, 75 bis 150µg werden als stark und über 150µg werden als sehr stark bezeichnet.

Wirkungseintritt und -Dauer nach ca. 20 Min. -1 bis 11 Std.

Wirkung: Die LSD-Wirkung ist sehr stark von Dosis, Set und Setting abhängig. Als Halluzinogen intensiviert und verformt LSD deine Sinneswahrnehmungen und das Raum-Zeit Empfinden verändern sich stark. Deine Stimmung und deine Gefühle können sich abrupt verändern, von minimal hochpushend bis hin zu Angstauslösung. Dabei können kreative Gedanken, neue Ideen oder spirituelle Erfahrungen entstehen. Bei hohen Dosierungen kann eine Loslösung vom eigenen Körper stattfinden.

Nebenwirkungen: Besonders in der Anfangsphase des Trips können leichte Übelkeitsgefühle, Heißwasser, Schwindelanfälle, verbreiterter Blutdruck und Ohnmacht auftreten. Es kommt zu einer starken Produktion von Speichel und Schweiß. Die Körpertemperatur erhöht sich leicht, die Pupillen werden erweitert und die optische Fokussierung erschwert. Gähnen ohne Müdigkeit setzt ein. Die Reflexe im psychischen Bereich sind von der Persönlichkeitsstruktur des Users der Umwelt abhängig. Die Wahrnehmungsveränderungen können so intensiv sein, dass Userinnen sich von der Flut von Eindrücken überfordert fühlen. Vor allem bei Nichtbeachtung der Regeln während Set und Setting kann es zu Fehlreaktionen, Orientierungsverlust, Panik, Paranoia und "Horrortrips" kommen.

Langzeitrisiken: Es besteht - auch bei einmaliger Einnahme - die Gefahr, dass starke (verlängerte) psychische Störungen ausgelöst werden können.

Infos zu 1cP-LSD

Das nicht psychoaktive 1cP-LSD entsteht bei der Herstellung von LSD und deutet auf eine unsachgemässe Synthese hin. Es gibt bis jetzt keine wissenschaftlichen Belege darüber, ob 1cP-LSD die Wirkung von LSD auf irgendeine Art und Weise beeinflusst.

Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast Substanzen analysieren zu lassen, teste maximal einen Viertel oder einen Drittel Pfiff an, da Filze in sehr unterschiedlicher Dosierung im Umlauf sind.
- Warte nach der Einnahme 2 Stunden, da immer wieder auch Filze mit unerwarteten Wirkstoffen im Umlauf sind, welche einen späteren Wirkungseintritt haben können.
- Akzeptiere wenn die Wirkung zu Ende geht.

Testing ecstasy tablets and pills from the street is a very valuable harm reduction tool. Any of the available methods of pill testing can help. We can only differentiate between substances with our current drug checking capacities. Some substances, such as most benzodiazepines, do not produce a positive result in any test. Many substances, such as MDMA, 2C-B, ketamine, and GHB, require specific tests to be identified. Pill testing can help reduce the risk of unknowingly consuming substances that are much stronger than you intended, substances that you are allergic to, substances that may interact dangerously with medications you are taking, or substances that you have a bad experience with in the past. Pill testing can also help reduce the risk of consuming substances that may cause long-term health problems. Pill testing can help reduce the risk of consuming substances that may cause long-term health problems.