

1T-LSD mit Verunreinigungen verkauft als 1V-LSD

 **Wanted**

 **Falschdeklaration**

Sowei (2018)

21.06.2019

Risiko einschätzung

Dieses als 1T-LSD deklarerte Pfla enthält nicht 1T-LSD, sondern 1V-LSD (Menge nicht bestimmbar) sowie zwei unbekannte Verunreinigungen (Menge nicht bestimmbar).

Sowei 1T-LSD als auch 1V-LSD sind LSD-Analoga. LSD Analoga sind Substanzen, welche chemisch eine grosse Ähnlichkeit mit LSD besitzen und vergleichbar wirken können. Bei beiden Substanzen handelt es sich um sogenannte 1-acetyls LSD-Verbindungen. Es wird vermutet, dass sie sich im Körper in LSD umwandeln (als funktionell als sogenannte Prodrugs) und somit eine vergleichbare psychotrope Wirkung wie LSD entfalten.

Wie potent diese Prodrugs im Vergleich zur direkten umwandelten Substanz analog (1V-LSD bis zu LSD), und in welchem Ausmass jeweils eine Verfestigung der Wirkungsintensität erfolgt, ist möglicherweise substanzabhängig und nicht zu verallgemeinern. Daher ist es wichtig, sich vorzeitig an die Dosiswirkung heranzustellen, um Überraschungen zu vermeiden.

Zusätzlich zu 1V-LSD wurden zwei unbekannte Verunreinigungen festgestellt. Gleiches gilt auch für die Nachbestimmung mit 1T-LSD.

Zu Risiken, Nebenwirkungen, Toxizität und Langzeitfolgen von 1T-LSD und der Verunreinigungen liegen keine Informationen vor. Deshalb wird vom Konsum abgeraten!



Zusammenfassung

1T-LSD, Menge nicht bestimmbar

Verunreinigungen, Menge nicht bestimmbar

Anzahl an gemessenen Substanzen

Name	Summenwert	Form
1,8 mm	3,7 mm	Orange

Stärke

µg

Wichtige Substanzen

Name

Psychotrope

Substanzen

2/170

Bafer Übe

Analyse

Lasse diese Substanzen in einem Drug Checking testen.

Verdacht

Dieses kleine Pfla ähnelt eher und kleineren Dosisen (2-40 Mikrogramm) und auch ein Teil in der Packung an der rechten L-Ö, um eine Überdosis/Verpackung zu vermeiden.

Ergebnis

Eine der beiden Möglichkeiten (eine Substanz) konnten wir finden, falls nicht maximal einen Dosis von 170 µg, die eine viele hochkonzentrierte Pfla im Einsatz sind.

Wirkung

Wenig nach der Einnahme (2 Stunden), die immer wieder auch Pfla mit unvollständiger Wirkung im Einsatz sind, welche einen starken Wirkungseffekt haben können.

