

# Casa de Papel (MDMA und Methamphetamin)

## ⚠️ Warnung

Hochdosierte MDMA-Pille mit Methamphetamin

Lausanne (Nightlife Vaud)

24.07.2024

## Risikoeinschätzung

Diese als MDMA deklarierte Pille enthält neben einer hohen Dosis MDMA zusätzlich Spuren von Methamphetamin. Dieses Logo wurde bereits mehrmals in verschiedenen Drug Checking-Angeboten getestet und es konnten jeweils unterschiedliche Dosierungen von MDMA und von Methamphetamin festgestellt werden.

Über 1.5 mg MDMA pro kg Körpergewicht für Männer und 1.3 mg pro kg Körpergewicht für Frauen ist zu viel (Bsp. Frau 60 kg x 1.3 = max. 78 mg MDMA). Es kann zu Nebenwirkungen wie Kiefernahlen, Augen- und Muskelzucken oder Krampfanfällen kommen. Bei Überdosierungen steigt die Körpertemperatur stark an und es können Halluzinationen auftreten. An Folgetagen, nach der Einnahme solch hoher Dosen MDMA, treten vermehrt Depressionen, Konzentrationsschwächen, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit sowie ein Gefühl starker Antriebslosigkeit auf. Die regelmässige Einnahme grosser Mengen MDMA ist neurotoxisch und vergrössert die Wahrscheinlichkeit irreparabler Hirnschäden.

Methamphetamin gehört zur Stoffgruppe der Phenylethylamine und weist eine stark stimulierende Wirkung (Psychostimulans) auf. Es erhöht den psychischen und körperlichen Antrieb im menschlichen Körper. Im Gegensatz zu MDMA wirkt Methamphetamin weniger entaktogen (das Innere berührend, stärkere Wahrnehmung der eigenen Emotionen) und auch weniger empathogen (Empathie steigernd). Methamphetamin hat im Vergleich zu MDMA eine deutlich längere Wirkdauer (mit Nachwirkungen bis zu 24h). Eine unbeabsichtigte Einnahme kann Konsumierende rasch überfordern.

**Die gleichzeitige Einnahme dieser beiden Substanzen stellt eine hohe Belastung für das Herz-Kreislaufsystem dar. Die Einnahme von sehr hohen Dosen MDMA und Methamphetamin führt zu einer starken Konzentration von Serotonin im Gehirn. Dies erhöht das Risiko von lebensbedrohlichen Komplikationen wie zum Beispiel einem Serotonin-Syndrom.**

Wir raten vom Konsum dieser Pille ab!

## Safer Use

### Analyse

Lasse deine Substanzen in einem Drug Checking testen

### Trinken

Denk daran: Trink alkoholfreie und isotonsche Getränke (3 dl / Stunde) und mach von Zeit zu Zeit Pausen an der frischen Luft, um einer Überhitzung / Dehydration vorzubeugen.

### Antesten

Falls du keine Möglichkeit hast, Substanzen analysieren zu lassen, teste zuerst maximal einen Drittel der Pille an, da sehr viele hochdosierte Pillen im Umlauf sind.

### Akzeptieren

Akzeptiere, wenn die Wirkung zu Ende geht, denn «Nachspicken» erhöht die Toxizität (Gifftigkeit) von MDMA.

### Abwarten

Warte nach der Einnahme 2 Stunden, da immer wieder auch Pillen mit unerwarteten Wirkstoffen im Umlauf sind, welche einen späteren Wirkungseintritt haben können.



## Substanzen details

MDMA	Methamphetamin
173.3 mg	ca. 5.7 mg

## Angaben zur getesteten Substanz

Dicke	Länge x Breite	Gewicht
4.8 mm	9.6 x 14.5 mm	570 mg

Farbe	Bruchrille
Rosa	Ja

## Relevante Substanz(en)

MDMA	Methamphetamin
------	----------------